

GANESPALTEAFDELINGEN

# Taleklangsforbedrende operation



# Information om taleklangsforbedrende operation

Du/dit barn er blevet henvist til Goneråd til en vurdering af, om der kan tilbydes taleklangsforbedrende operation. Denne folder informerer om forhold omkring operationen, så du er mere velforberedt, når du kommer til Goneråd.

## Taleklangsforbedrende operation

En taleklangsforbedrende operation udføres på Rigshospitalet.

Operationen tilbydes børn, hvor den bløde gane ikke kan danne et tilstrækkeligt lukke mellem næse og mund under tale, hvormed der slipper uønsket luft ud af næsen.

Hos nogle børn høres resultatet af operationen først efter flere måneder, og forbedringer af talen kan forekomme op til et år efter operationen. Operationen mindsker udelukkende luftspildet til næsen, mens eventuelle udtalevanskeligheder forsat vil kræve undervisning hos talepædagog i hjemkommunen.

## Goneråd

Her deltager behandlerteamet, som består af en kirurg fra

Rigshospitalet samt en talepædagog, tandlæge, sundhedsplejerske og øre-næse-halslæge.

På baggrund af forudgående undersøgelser vil

muligheden for operation blive vurderet i samråd med forældre og barn. Det anbefales at forberede eventuelle spørgsmål hjemmefra, da der er tale om en kort konsultation.

## Hvor foregår operationen?

Operationen udføres på Rigshospitalet på plastikkirurgisk afdeling.

Tre-fire uger inden operationstidspunktet sender Rigshospitalet en

indkaldelse samt en pjece med oplysninger om indlæggelsesforløbet. Barnet vil blive indlagt sammen med en af sine forældre på

Børneklivnikken på Rigshospitalet, og indlæggelsen varer ca. fem dage. Det er muligt at søge om tabt arbejdsfortjeneste hos hjemkommunen.

Dette skal ske inden afrejse til Rigshospitalet. Det er kommunen, som efter en konkret vurdering beslutter, om der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste.

## **Bivirkninger**

De første dage efter operationen vil barnet typisk få ondt i hals og nakke, som afhjælpes med smertestillende medicin. Der kan dog stadig være gener i forbindelse med at spise og drikke, og nogle børn taber sig i vægt. Som følge af operationen kan der opstå snorken og i sjældne tilfælde søvnapnø.

Hvis barnet er i skolealderen anbefales det, at barnet holdes hjemme i 2 uger. Går barnet i børnehave anbefales det, at barnet holdes hjemme i 4 uger efter operationen

## **Kontrol**

Tre måneder efter operationen vil I blive indkaldt til en kontrol hos øre-næse-halslæge og talepædagog i Ganespalteafdelingen.

Øre-næse-halslægen undersøger, hvordan såret er helet. Talepædagogen vurderer talen og tager stilling til, om der skal henvises til undervisning hos talepædagog i barnets hjemkommune.

Har I yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

logopæderne i Ganespalteafdelingen

Mia Kisling-Møller	7847 9530
Anne Bødker	7847 9531
Joan Bogh Nielsen	7847 9532
Louise Leturgie	7847 9533
Berit Emborg	7847 9534
Tine Pilegaard Juul	7847 9231



Institut for Kommunikation og Handicap

**Ganespalteafdelingen**

Peter Sabroes Gade 4  
8000 Aarhus C

Tlf. 7847 9533  
[www.ikh.rm.dk](http://www.ikh.rm.dk)

**Rigshospitalet**

HovedOrtoCentrets Børneklíník  
Afsnit 3082 / 3083  
Blegdamsvej 9  
2100 København Ø

Tlf. 3545 3082 eller 3545 3083  
[www.rigshospitalet.dk](http://www.rigshospitalet.dk)